



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

آمپوتاسیون اندام ها(قطع عضو)

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و حین ترخیص آمپوتاسیون اندام ها(قطع عضو) طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ اقدامات قبل از عمل

- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل برای شما سرم وصل شده و برای پیشگیری از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق میشود.
- ✓ شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا سالاد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چای قهوه و آب هم ننوشید.
- ✓ قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید.
- ✓ موهای موضع عمل ، قبل از عمل لازم است تراشیده شود.
- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.
- ✓ کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و ...) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.
- ✓ در صورت داشتن سابقه بیماری، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.
- ✓ در صورتی که بیماری خاصی دارید که تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و داروهای جدید جایگزین شود.
- ✓ عمل شما تحت بیهوشی عمومیانجام میشود.
- ✓ از مصرف سیگار و دخانیات در چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.
- ✓ گرافی های قبل از عمل را به همراه داشته باشید.
- ✓ برای مراقبت و بهبودی خود بعد از عمل برنامه ریزی کنید. فردی را بیابید که بعد از عمل جراحی از شما مراقبت کند.

❖ رژیم غذایی

- ✓ بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات شروع کنید.
- ✓ در صورتی که حالت تهوع و استفراغ داشتید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.



❖ فعالیت

- ✓ در بستر، انگشتان و مج پاهای سالم را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاهای پیشگیری شود.
- ✓ در صورت اجازه پزشک برای خروج از تخت ابتدا نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.
- ✓ سعی کنید هر چه سریعتر از بستر خارج و فعالیت نمایید تا از ایجاد لخته جلوگیری شود .

❖ مراقبت

- ✓ ممکن است یک لوله جهت خروج ترشحات در ناحیه عمل گذاشته شود که به یک مخزن وصل میباشد که به آن هموواگ میگویند . معمولاً این لوله 48 ساعت بعد از عمل خارج میشود.
- ✓ از کشیدن لوله هموواگ و خارج کردن آن خودداری نمایید.
- ✓ در صورت داشتن درد، به پرستار اطلاع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات لازم جهت تسکین درد شما را انجام دهد.
- ✓ در صورت خونریزی از محل عمل جراحی و خیس شدن پاسمن به پرستاران بخش اطلاع دهید.
- ✓ از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید.
- ✓ داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد.
- ✓ استفاده از وسایل کمک حرکتی مثل عصا و واکر و ...در زمان آمپوتاسیون پاهای شروع حرکت کمک کننده است هنگام راه رفتن با عصا ، حداکثر وزن خود را به دستها وارد کنید.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

آمپوتاسیون اندام ها(قطع عضو)

❖ رژیم غذایی

- ✓ برای تسريع التیام بافت نرم و استخوان، رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری استفاده کنید.
- ✓ جهت پیشگیری از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات) حاوی سبوس و مایعات فراوان استفاده کنید.
- ✓ غذای سالم مانند میوه، سبزیجات، غلات، لبیتیات کم چرب و ماهی بخورید.
- ✓ صرف سبزیجات و مرکبات و آب میوه های تازه حاوی ویتامین ث میتواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند.

❖ فعالیت

- ✓ فعالیت به تدریج افزایش یابد تا از خستگی جلوگیری شود .
- ✓ به انجام ورزش های سبک پردازید و از انجام ورزش های شدید بدنه اجتناب کنید.
- ✓ زیاد نرمش و ورزش کنید.
- ✓ معمولاً بعد از جراحی، در صورت اجازه پزشک میتوانید با واکر یا عصای زیر بغل راه بروید ولی تا چند هفته و تا زمان گذاشتن پروتز برای انجام کارهای روزمره به کمک نیاز دارید که باید در برنامه ریزی قبل از جراحی به این نکته توجه داشت.

❖ مراقبت

- ✓ باید تغییراتی در وضعیت محل زندگی ایجاد کنید تا از زمین خوردن شما جلوگیری شود.
- ✓ در حمام دستگیره هایی روی دیوار نصب کنید تا در هنگام تغییر وضعیت از آنها استفاده کنید و از لیز خوردن خود جلوگیری کنید.
- ✓ دو طرف پله ها باید دستگیره داشته باشند تا در حین بالا و پایین رفتن از پله از آنها استفاده کنید.
- ✓ تمام فرش های لغزنه و سیم های برق رها شده در کف منزل باید جمع آوری شوند تا احتمال زمین خوردن کاهش یابد.
- ✓ قطع عضو به معنای شروع یک زندگی جدید برای شما و خانواده شما است .شما و وابستگان شما ممکن است احساس غم، خشم و شرم داشته باشید .این احساسات طبیعی هستند .در باره این احساسات به خانواده و دوستان خود صحبت کنید .به آنها اجازه بدھید به شما کمک کنند.
- ✓ بعد از عمل جراحی پانسمان روز زخم شما باید بطور روزانه تعویض شود .زخم و پوست اطراف آن باید تمیز و خشک نگهداری شود
- ✓ پزشک معالج برای شما داروهای آنتی بیوتیک و ضد درد تجویز کرده است .آنها را طبق دستور پزشک مصرف کنید .



- ✓ اگر مبتلا به دیابت هستید قند خون خود را کاملا کنترل کنید . عدم کنترل قند خون موجب تاخیر در بهبود زخم و افزایش خطر عفونت در آن میشود.
- ✓ باقیمانده اندام قطع شده (استامپ) را باید بعد از جراحی تا حد امکان بالا نگه داشت تا ورم آن کم شود.
- ✓ در آمپوتاسیون های زیر زانو سعی کنید استامپ همیشه در امتداد ران شما باشد . آنرا در حالت خم نگهداری نکنید . این حالت نه تنها موجب ورم آن میشود بلکه موجب میشود زانوی شما در حالت خمیده باقی بماند و بعداً پوشیدن اندام مصنوعی برای شما مشکل باشد . روزی چند بار یک بالشت را بر روی زانوی خود قرار دهید تا آنرا در حالت صاف و مستقیم تحت کشش قرار دهد.
- ✓ در آمپوتاسیون های بالای زانو هم سعی کنید استامپ در امتداد تنہ شما باشد . آنرا در حالت خم به جلو نگه ندارید . این وضعیت موجب میشود . رباط ها و تاندون های جلوی کشاله ران شما بتدریج کوتاه شود و وقتی بخواهید با پروتز راه بروید راه رفتن برای شما مشکل خواهد شد . روزی چند بار و هر بار 10-20 دققه به شکم بخوابید تا عضلات و تاندون های جلوی کشاله ران شما کشیده شوند.
- ✓ بخیه های استامپ بعد از 3-2 هفته خارج میشوند . بعد از این زمان آنرا روزانه با آب و صابون شسته و خشک کنید.
- ✓ از کرم، پماد یا لوسيون بر روی پوست استامپ استفاده نکنید.
- ✓ محل قطع عضو را هر روز بدقت بررسی کنید.
- ✓ جاهایی از آنرا که نمیبینید با آیینه بررسی کنید.
- ✓ مراقب علائم فشار مانند قرمزی، خراش یا تاول باشد . در صورت دیدن این علائم آنرا به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- ✓ استامپ را بر روی یک بالشت نرم فشار بدهید و بتدریج مقدار فشار را بیشتر کنید . این کار موجب میشود بافت های آن قسمت بتدریج به فشارعادت کنند.
- ✓ جای بخیه های قبلی را ماساژ دهید . این کار هم موجب نرم شدن بافت سفتی میشود که در محل جراحی ایجاد شده و هم حساسیت آنرا کمتر کرده و جریان خون محل را هم بیشتر میکند.
- ✓ محل استامپ را با باند کشی بصورت حرف 8 انگلیسی ببندید . این بانداز فشاری کمک میکند تا ورم محل کم شود . هر چه ورم استامپ زودتر بخوابد فرد میتواند زودتر از اندام مصنوعی) پروتز (استفاده کند.
- ✓ در حین پیچیدن باند کشی کمی آنرا بکشید . اگر نیاز دارید تا از بیش از یک باند کشی استفاده کنید . هر باند کشی که تمام شد قبل از بستن بعدی، انتهای باند قبلی را با گیره خوب ببندید . دقت کنید که تمام انتهای استامپ با باند کشی بسته شود.
- ✓ باند کشی را روزی 3-2 بار باز کرده از نو ببندید تا کشش آن حفظ شود.
- ✓ باند کشی همیشه باید بسته باشد مگر موقعی که به حمام میروید .
- ✓ سیگار نکشید و از استرس های روحی دوری کنید.
- ✓ تا حد امکان خود را درگیر کار و فعالیت کنید.



- ✓ وقتی که زخم محل جراحی شما بطور کامل خوب شد باید سعی کنید در تمام طول روز پروتژ خود را بپوشید.
- ✓ صبح که از خواب برخاستید اول پروتژ خود را بپوشید و گرنه استامپ شما ورم کرده و پوشیدن آنرا دشوار میکند .
- ✓ سوکت استامپ را هر روز با یک پارچه نخی نمناک که آغشته به کمیماده شوینده است تمیز کنید تا از عرق و آلودگی پاک شود .سپس باقیمانده ماده شوینده را با پارچه نخی نمناک پاک کرده و خشک کنید.
- ✓ باید از پروتژ خود خوب مراقبت کنید .اگر پروتژ شما مشکلی دارد سعی نکنید خودتان آنرا درست کنید،با تکنسین ارتوپدی که آنرا برای شما درست کرده تماس بگیرید.
- ✓ پروتژ شما حتی اگر به ظاهر سالم باشد باید سالی یک بار، توسط تکنسین ارتوپدی فنی که آنرا درست کرده بازبینی شود.
- ✓ برای بهبود تصویر بدنی به اندام باقی مانده نگاه کنید و آن را لمس کنید.
- ✓ استقلال خود را به دست بیاورید و حقایق را بپذیرید.
- ✓ اگر قطع عضو زیر زانو است استامپ در کنار تخت و کنار صندلی چرخدار آویزان نباشد ، موقع خوابیدن زانو را خم نکنید.

واحد آموزش سلامت بیمارستان شهید راثی شاهیندۀ

بهار 1402