

تب تشنج

آموزش به بیمار/همراه



در صورت هر گونه سوال در خصوص بیماری از طریق
ذیل تماس بگیرید:

شماره تلفن ۴۶۳۲۲۱۳۵_داخلی ۲۵۴

روزهای شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

Shahindezh.edh@umsu.ac.ir

سرانجام این عارضه چیست؟

در حدود یک سوم کودکانی که دچار تشنج شده اند، طی ۶ ماه بعد دچار تشنج مجدد می شوند . ولی احتمال تشنج ناشی از تب در کودکان بزرگتر از ۵ سال بسیار کم است.

نکات: جهت کنترل تب و تشنج، پزشک برای کودک شما از داروهای ضدتشنج مانند دیازپام، فنی توئین و یا فنوباربیتال استفاده میکند که ممکن است سبب خواب آلودگی کودک شود، کم خونی فقر آهن احتمال تشنج ناشی از تب را افزایش می دهد لذا بررسی کودکان از این نظر توصیه میشود

منبع: درسنامه پرستاری کودکان-وونک

تئیه و نظمیم: واحد آموزش سلامت - اسفند ۱۴۰۲

مشاور علمی: دکتر احمدی سپهری _ متخصص اطفال

- در صورتی که کودک بیش از ۳ ماه دارد، از قطره استامینوفن استفاده کریم.

- درجه حرارت اتفاق کودک را در حدود ۲۵ درجه قرار دهید.

- از پنکه یا بادبزن برای خنک کردن کودک استفاده کریم.

در صورت بروز تشنج چه باع کرد؟

➢ مطمئن شوی که کودک نفس می کشد.
➢ رنگ ظاهری (ممکن است کودک کمی رنگ پریه و کبود شود) و نبض کودک را کنترل کریم.

➢ صورت کودک را به یک طرف متمایل کریم تا محتویات دهانش به بیرون بریم.
➢ دست و پای کودک را نگه نداریم. از کودک خود محافظت کریم تا آسیبی نمایم.

➢ اجسام تغذیه ای سخت را از اطراف او دور کریم
➢ تا وقتی کودک در حال تشنج است، سعی نکریم به او دارویی مایعات بخوراند.

➢ آرام باشید و در کنار کودک خود باقی بمانید.
➢ یک جسم صاف و نرم مثل بالش زیست سر کودک قرار دهید.

➢ لباس های تنگ وی را آزاد کریم.

پزشک چه اقداماتی انجام خواهد داد؟

در صورتی که کودک برای اوکن بار دچار چرعن حالتی شده باشد، ممکن است پزشک جهت رد منزهی و بررسی از این نظر کودک را در بیمارستان بستری نمایم در صورت وجود عفونت پزشک آنقدر بیوئیک تجویی خواهد کرد.

• دفع ادرار یی مدفعه

مرحله دوم تشنج

کمتر از ۵ دقیقه طول می کشد.
کودک در این مرحله هوشگار نیست.

- ✓ دست و پا جمع و خشک شده ، کودک حالت کششی به خود می گیرد.
- ✓ چشم ها به بالا حرکت کرده و کودک هیچ واکنشی نشان نمی دهد
- ✓ در پایان مرحله دوم کودک هوشگاری خود را بدهست می آورد و ممکن است به مدت ۱۱ تا ۲ ساعت به خواب عمیق فرو رود و در زمان بعد از خواب آلوود و گیج باشد

درمان :

اقدامات در منزل

درجه حرارت بدن کودک را پایین بگیر.

- بیشتر لباس های کودک را در آوریخ و در صورتی که کودک در تختخواب است از روانداز ضخیم و پتو استفاده نکریم.
- با استفاده از آب ولرم با کمک پارچه و با آب ولرم کودک خود را خنک کریم.

تشخیص:

ممکن است پزشک برای معالجه کودک شما بررسی های مایع مغزی نخاعی را لازم بداند پس با انجام آن موافقت نمایید این کار جهت تشخیص بیماریهای خطربناک از جمله مننزه بیت ضروری و در عین حال بی خطر است ، معمولاً برای بررسی همه جانبیه و رد علل دیگر از کودک شما نمونه خون و ادرار گرفته می شود ، ممکن است در مواردی با صلاح دید پزشک از کودک نوار مغزی گرفته شود.

چه موقع والدین باید به پزشک مراجعه نمایند؟

اگر با تمامی تداعیه دارویی و تن شوی در کودکان زی ۲ سال پس از ۲۴ ساعت و برای کودکان بالای ۲ سال تا ۷۲ ساعت تب ادامه یابد و یا در صورتی که حمله ی ناشی از تب بیشتر از ۵ دقیقه طول بکشد، لازم است به پزشک مراجعه کریم.

علایم بالینی:

اواین مرحله تشنج

حدود ربع دقیقه به طول می انجامد

- کاهش سطح هوشگاری
- سفت شدن بدن
- وقفه در تنفس به مدت ربع دقیقه و هنگامی که مجددا تنفس شروع می شود ، بسیار سطحی انجام میگیرد ، بصورتی که تشخیص آن به سختی امکان پذیر است.

تشنج ناشی از تب نوعی از تشنج است که به دنبال تب بالا (بیشتر از ۳۹ درجه سانتی گراد) اتفاق می افتد. این تب به علت وجود عفونت در بخشی از بدن به جز مغز است.

تشنج تب دار در کودکان بین سیزده سالگی اتفاق می افتد. شایعترین نوع تشنج در دوران کودکی می باشد که در پسرها شایع تر است.

پیش آگهی خوبی دارد چون بیشتر در بچه هایی اتفاق می افتد که از نظر عصبی سالم می باشند و پس از تب و تشنج هم طبیعی می مانند و باعث مرگ نمی شود. مدت این نوع تشنج معمولاً کمتر از ۱۰ دقیقه است ، پس اگر بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طول بی انجامد مهم است .

معمولایک بار در طول شب اتفاق می افتد پس اگر در همان روز تکرار شود مهم است .



علت:

تشنج ناشی از تب در نتیجه افزایش ناگهانی دمای بدن بوجود می آید . تشنج اغلب همراه با یک عفونت دستگاه تنفسی ، نظیر سرماخوردگی است. کودکان اغلب مستعد این تشنج هستند، زی ا تکامل مغز در آنها هنوز کامل نشده است.