



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

ترومبوسیتوپنی

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و حین ترخیص **ترومبوسیتوپنی** طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

❖ درمان

- ✓ در بعضی موارد خفیف درمانی لازم نیست.
- ✓ برنامه های درمانی دیگر بسته به علت زمینه ای ایجاد این بیماری متفاوت است با درمان علت به وجود آوردن این بیماری میتوان بیماری را درمان کرد. به عنوان مثال قطع داروهایی که موجب ترومبوسیتوپنی شده است نیز موجب افزایش پلاکتها میگردد.
- ✓ در موارد ترومبوسیتوپنی دائمی جراحی برای برداشتن طحال انجام میگردد.
- ✓ برای بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی مزمن و حاد تزریق پلاکت نیز انجام میگیرد.
- ✓ ممکن است در زمان تشخیص و در موارد عودکننده، کورتیکواسترودیوها تجویز شوند.
- ✓ در طی مرحله حاد یک حمله شدید ممکن است گاماگلوبین تجویز گردد.
- ✓ در موارد دائمی ممکن است از داروهایی درمانی سرکوب گر اینمی استفاده شود.

❖ رژیم غذایی

- ✓ با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات و سپس رژیم معمولی خود را شروع کنید.
- ✓ در صورتی که حالت تهوع و استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.

❖ فعالیت

- ✓ به منظور پیشگیری از لخته شدن خون در سیاهرگ های اندام تحتانی و یا پاها، ساق پا را به طور مکرر خم و راست کنید.
- ✓ برای خارج شدن از تخت پس از اجازه پزشک ابتدا لبه تخت نشسته و پاها خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن سرگیجه و تاری دید و ... میتوانید از تخت خارج شوید. دقیقاً حتی پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.

❖ مراقبت

- ✓ از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید.
- ✓ اگر در زمان تزریق پلاکت، تنگی نفس یا کهیر مشاهده نمودید به پرستار خود اطلاع دهید.
- ✓ در صورت مشاهده خونریزی از اندام های پدن و یا در مدفوع به پرستار خود اطلاع دهید.
- ✓ در زمان خارج کردن برآنول از داخل رگ محل خروج را تا چند دقیقه فشار دهید تا خونریزی نکند.



- ✓ مواظب باشید در زمان خواب و استراحت برانول یا لوله سرم از دست شما خارج نشود.
- ✓ ممکن است روزانه برای تعیین میزان پلاکت خون از شما خونگیری شود.
- ✓ از مصرف خودسرانه داروها و بدون اجازه پزشک خودداری نمایید.
- ✓ داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای به شما داده خواهد شد.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

ترومبوسیتوپنی

❖ رژیم غذایی و تغذیه

- ✓ مصرف غذاهایی زیر که حاوی مقدیر زیادی اسیدوفولیک میباشند را افرایش دهید:
- ✓ سبزیجات از جمله اسفناج، بروکلی و کاهو، کلم پیچ پخته شده، قارچ، لوبیا، نخود فرنگی و عدس بادام کوهی، جو دوسر، لوبیا چیتی و جوانه گندم، میوه هایی همچون لیمو، موز، طالبی، هندوانه، پرتقال، کیوی و عنبه، زرده تخم مرغ، شیر، دانه های آفتابگردان و حبوبات، مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین B12 مانند گوشت سفید و قرمز، تخم پرنده، شیر، پنیر، ماست، دل و جگر گوساله، گاو، مرغ، قلوه، مغز، خوب غذا بخورید. در رژیم غذایی خود سبزیجات تازه، گوشت، و سایر پروتئینهای حیوانی را بگنجانید.
- ✓ در صورت مصرف الکل یا نوشیدنی های کافئین دار، آن را از رژیم غذایی خود حذف نمایید.
- ✓ مصرف شیر را افزایش دهید.
- ✓ با مصرف سبزیجات میتوانید از بیوست جلوگیری کنید.

❖ فعالیت

- ✓ چند روز اول بیماری استراحت نمایید و از انجام ورزش خودداری کنید.
- ✓ در صورت اجازه پزشک میتوانید ابتدا ورزش های سبک انجام دهید.
- ✓ از انجام ورزش های سنگین و ورزش های که موجب آسیب به بدن و خونریزی میگردد، اجتناب نمایید.

❖ مراقبت

- ✓ در هنگام کار با وسایل تیز و برنده مواظب باشید تا بریدگی ایجاد نکنید.
- ✓ طبق دستور پزشک هر چند وقت یکبار آزمایش خون انجام دهید.
- ✓ از مساوک نرم استفاده نمایید.
- ✓ بهداشت دهان و دندان خود را رعایت نمایید.
- ✓ از زور زدن و فین کردن خودداری کنید.
- ✓ در معرض گرمای زیاد قرار نگیرید.
- ✓ در زمان خارج کردن برآنول از داخل رگ محل خروج را تا چند دقیقه فشار دهید تا خونریزی نکند.
- ✓ از مصرف خودسرانه آسپرین و سایر داروهای ضد انعقادی بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ اگر علایم در طی درمان بدتر شوند.



- ✓ اگر به صورت بسیار شدید شروع به از دست دادن خون کردید .
- ✓ اگر علایم جدید یا غیرقابل توجیه ایجاد شود .
- ✓ داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند . به ویژه کورتیکواستروئیدها عوارض جانبی و واکنشهای زیان بار بسیاری دارند که مستلزم پیگیری هستند .

واحد آموزش سلامت بیمارستان شهید راشی شاهیندز

بهار 1402