

## سندرم دیسترس تنفسی

آموزش به بیمار/همراه



در صورت هر گونه سوال در خصوص بیماری از طریق ذیل

تماس بگیرید:

داخلی ۲۵۴-۴۶۳۲۲۱۳-۰۴۴ (روزهای شنبه، دوشنبه و

چهارشنبه)

Shahindezh.edh@ umsu.ac.ir

➤ درجه حرارت زیر بغل بیشتر از 37/5 سانتی گراد

➤ خون دماغ

➤ استفراغ

➤ سرفه و آبریزش

➤ قرمزی چشم

منبع: نوزادان. نلسون

نوزادان. زهراهادیان شیرازی، راحله ثابت سماواتی

تهیه و تنظیم: واحد آموزش سلامت - اسفند ۱۴۰۲

مشاور علمی: دکتر احمدی سپهری \_ متخصص اطفال

➤ از تمامی افراد سرما خورده و کودکان کم سن و سال  
که اغلب ناقل میکروب هستند با فرزندتان جلوگیری  
کنید.

➤ سیگار نکشید چرا که سیگار ریه های نوزاد شما را

ضعیف کرده و او را مستعد ابتلا به بیماری می کند



اگر در نوزاد خود علائم زیر را دیدید فوراً به مراکز درمانی  
مراجعه کنید.

➤ خواب آلودگی

➤ تنفس مشکل یا قطع تنفس

➤ تشنج

➤ چشم اشک آلود

➤ اسهال و زردی

## سندرم دیسترس تنفسی (RDS):

سندرم دیسترس تنفسی که بطور رایج بین نوزادان نارس دیده می شود به علت عدم وجود سورفکتانت می باشد. سورفکتانت یک نوع چربی است.

در حبابچه های داخل ریه (آلوئولها) که به طور نرمال مایع وجود دارد اگر این چربی نباشد حبابچه ها روی هم می خوابند (مثل دو تکه کاغذ خیس که به سختی از هم جدا می شوند اما اگر این کاغذها روغنی باشند و بعد خیس شوند به راحتی از هم جدا می شوند)

با روی هم خوابیدن حبابچه ها تهویه هوا (سطح تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن) دچار اختلال می شود

## علائم سندروم دیسترس تنفسی:

- افزایش تعداد تنفس
- حرکت پره های بینی
- ناله کردن تنفس عمیق
- قطع تنفس و کبود شدن نوزاد

## درمان:

با تزریق سورفکتانت (چربی) داخل ریه های نوزاد به همراه وصل کردن نوزاد به دستگاههایی که با ایجاد فشار از روی هم خوابیدن حبابچه ها (الوئولها) جلوگیری می کند است

## درمان های حمایتی:

- دریافت مایعات داخل وریدی (تزریق سرم)
- به میزان لازم و گرم نگهداشتن نوزاد

اگر علیرغم کامل شدن سن حاملگی در نوزادان نارس همچنان نیاز به دریافت اکسیژن باشد، نوزاد دچار بیماری ریوی مزمن شده است و میزان اکسیژنی که به نوزاد داده می شود حتما بایستی تنظیم شده باشد.

در اثر دریافت اکسیژن بیش از نیاز نوزاد، احتمال ایجاد وابستگی اکسیژن و همچنین بروز عوارض چشمی وجود دارد.

بیماری مزمن ریوی بیشتر در نوزادان نارس نوزادان دچار عفونت و سوء تغذیه دیده می شود. دریافت بیش از حد مایعات در روزهای اولیه زندگی نوزاد هم می تواند به ایجاد بیماری مزمن ریوی کمک کند.

بستری مکرر در بیمارستان در نوزادان مبتلا به بیماری ریوی مزمن در ۲ سال اول زندگی شایع می باشد

برای درمان این نوزادان علاوه بر یک سری تدابیر پزشکی و کاهش تدریجی اکسیژن دریافتی نوزاد، رعایت نکاتی هم به والدین و اطرافیان نوزاد توصیه می شود.

- دور نگه داشتن نوزاد از جاهای شلوغ و مکانهای عمومی
- قبل از مراجعه به پزشک زمان دقیق ویزیت نوزادتان را بپرسید تا زیاد منتظر پزشک نشوید.



- در سن ۶ ماهگی واکسن آنفولانزا دریافت کند و دیگر فرزندان و مراقبین نوزاد هم باید این واکسن را دریافت کنند.