



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

برونشیت مزمن

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص **برونشیت مزمن** طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

❖ رژیم غذایی

- ✓ کاهش وزن و ورزش به میزان کاهش در کنار یک رژیم غذایی مناسب مفید میباشد.
- ✓ مواد غذایی پرکالری، پرپروتئین، پر ویتامین (ویتامین ث) مصرف کنید.
- ✓ تعداد وعدههای غذایی را افزایش داده ولی حجم غذای مصرفی را در هر وعده کاهش دهید .
- ✓ میوه و مایعات بیشتر مصرف کنید .
- ✓ از خوردن مواد حاوی کافئین مثل قهوه، چای، کولا، شکلات، غذاهای نفاخ (کلم، حبوبات و ...) خودداری کنید.
- ✓ مصرف منابع منیزیم سبب بهبودی آنزیمهای بدن میشود و همچنین سبب شل شدن عضلات مجاری هوایی میگردد که در آجیل، سبزیجات با رنگ سبز تیره، غذاهای دریایی و حبوبات موجود است.
- ✓ روغنهای امگا 3 مانند: روغن ماهی، سویا و سبزیجات منبع غنی از امگا 3 میباشد و به خاطر کاهش التهاب توصیه به مصرف آنها میشوند .
- ✓ مصرف روغنهای امگا را محدود نمایید (روغن درت، آفتابگردان و...)

❖ فعالیت

- ✓ هنگام استراحت ، در فواصل منظم در تخت چرخیده و وضعیت جدیدی به خود بگیرید.
- ✓ فعالیتهائی مثل لباس پوشیدن و قدم زدن به مدت کوتاه را بتدریج شروع کرده و برای جلوگیری از خستگی زیاد در فواصل لازم استراحت کنید.

❖ مراقبت

- ✓ برای بهبود وضعیت تنفسی خود، در وضعیت خم شده به جلو و با لبهای غنچه ای دم آهسته همراه با بازدم طولانی انجام دهید .
- ✓ برای پاک کردن راه هوایی، آرام و به صورت کنترل شده سرفه کنید.
- ✓ جهت تسهیل تنفس، سر تخت را بالا برده و به صورت نیمه نشسته در بستر استراحت نمایید .
- ✓ جهت تسهیل تنفس و برطرف شدن تنگی نفس، اکسیژن برای شما کار گذاشته میشود . در صورت بروز و یا تغییر علائم پرستار را مطلع نموده و از ایجاد تغییر در روند اکسیژن رسانی خودداری نمائید.



- ✓ برای رقیق شدن ترشحات و خروج خلط از بخور استفاده کنید.
 - ✓ جهت خروج خلط در فیزیوتراپی قفسه سینه و گرفتن نمونه جهت آزمایش با مسئولین همکاری نمایید .
 - ✓ بهداشت فردی (شستن دست، مسواک زدن و ...) را جهت جلوگیری از عفونتهای ناشی از عملکرد ضعیف سیستم ایمنی رعایت کنید .
 - ✓ پس از استفاده از داروی استنشاقی جهت کاهش خطر عفونتهای قارچی دهان، دهان را شستشو دهید .
 - ✓ مصرف مایعات را به 8-10 لیوان آب در روز افزایش دهید تا ترشحات ریوی رقیق تر شوند.
 - ✓ ساعات خواب و استراحت روزانه ی خود را تنظیم نمایید .
 - ✓ در صورت وجود تب و تغییر در رنگ و مقدار خلط، تنگی نفس و سرفه به پزشک اطلاع دهید .
 - ✓ در صورت داشتن سرفه های خشک و تنگی نفس به پزشک گزارش دهید
- ❖ دارو**
- ✓ داروها شامل آنتی بیوتیک (از بین بردن عفونت)
 - ✓ گشاد کننده برونش (تنفس راحت تر)
 - ✓ کورتیکواستروئیدها (کاهش التهاب)
 - ✓ سایر داروها طبق دستور پزشک توسط پرستار در فواصل و زمانهای مشخص شده به شما داده میشود.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

برونشیت مزمن

❖ رژیم غذایی و تغذیه

- ✓ بهتر است از رژیم غذایی سرشار از پروتئین، ویتامین و فیبر (سبزیجات، میوه و ...) استفاده نمائید.
- ✓ از خوردن غذاهای حاوی کافئین مثل قهوه، چای، کولا و شکلات خودداری کنید.
- ✓ از خوردن غذاهای نفاخ، ادویه دار و خیلی داغ یا خیلی سرد اجتناب کنید.

❖ فعالیت

- ✓ با نظر پزشک برای خود برنامه ورزشی مناسب تنظیم کنید و آنرا به طور منظم انجام دهید.
- ✓ فعالیت‌هایی مثل حمام کردن، لباس پوشیدن و قدم زدن به مدت کوتاه را بتدریج شروع کرده و برای جلوگیری از خستگی زیاد در فواصل لازم استراحت کنید.
- ✓ اگر کارهایی مثل فریاد زدن، بلند خندیدن، گریه کردن و فعالیت بدنی باعث بروز حملات سرفه شوند، از آنها خودداری کنید.

❖ مراقبت

- ✓ برای حفظ رطوبت محیط (کمک به رقیق شدن ترشحات ریه و خروج خلط) از بخور استفاده کنید.
- ✓ مصرف مایعات را به 8-10 لیوان آب در روز افزایش دهید تا ترشحات ریوی رقیقتر شوند.
- ✓ از قرار گرفتن در گرما و سرمای زیاد خودداری کنید زیرا باعث افزایش خلط و تنگی نفس خواهد شد.
- ✓ در صورت قرار گرفتن در محیط سرد از ماسک و شال گردن استفاده کنید.
- ✓ از قرار گرفتن در معرض تغییرات دمایی ناگهانی یا هوای سرد و مرطوب خودداری کنید.
- ✓ از قرار گرفتن در محیط شلوغ و با ترافیک سنگین و دود خودداری کنید.
- ✓ ساعات استراحت و خواب خود را تنظیم کنید.
- ✓ از مواد محرک تنفسی مثل سیگار (قلیان و پپ) پرهیز کرده و در محیط‌هایی که دود سیگار وجود دارد وارد نشوید.
- ✓ از افراد سرماخورده و مبتلا به عفونت‌های تنفسی دوری کنید.
- ✓ فشار روانی و کلیه موارد استرس زا را از خود دور کنید.
- ✓ با توجه به خطر مقاومت نسبی به آنتی بیوتیک نباید از آنتی بیوتیکها به طور روتین و بدون تجویز پزشک استفاده کنید.
- ✓ در صورت داشتن سرفه های خلط دار از داروهای ضد سرفه استفاده نکنید زیرا این داروها باعث بدتر شدن برونشیت مزمن میشوند و با پزشک خود مشورت نمایید.



❖ دارو

✓ آنتی بیوتیکها را به موقع استفاده کنید، درمان را کامل و در صورت بروز واکنشهای حساسیتی به پزشک اطلاع دهید .

✓ گشاد کننده های استنشاقی را 15 دقیقه قبل از کورتیکو استروئیدهای استنشاقی استفاده کنید .

✓ جهت تزریق واکسن آنفلوانزا در اول پاییز با پزشک معالج خود مشورت کنید .

❖ زمان مراجعه بعدی

✓ در صورت بروز علائم از قبیل تب یا استفراغ، خلط خونی، افزایش درد، تنگی نفس در حالت استراحت یا هنگامی که سرفه نمیکنید و یا هنگامیکه خلط علیرغم تلاش برای رقیق کردن آن غلیظ تر شود.

✓ در صورت بروز عفونت تنفسی و تب

✓ پس از مصرف داروها

واحد آموزش سلامت بیمارستان شهید رازی شاهیندژ