



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

آسم

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص آسم طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ رژیم غذایی

- ✓ غذا را در دفعات زیاد و با حجم کم مصرف نمایید و رژیم غذایی توصیه شده را رعایت نمایید.
- ✓ در صورت نداشتن محدودیت مصرف مایعات، در روز 6-8 لیوان مایعات جهت رقیق شدن و خروج خلط مصرف کنید.

❖ فعالیت

- ✓ زمان استراحت مابین تمرینات تنفسی داشته و در فعالیت تعادل داشته باشید.
- ✓ هر 2 ساعت یک بار در تخت تغییر وضعیت دهید.

❖ مراقبت

- ✓ تنفس لب غنچه ای، تنفس دیافراگمی و داشتن سرفه های موثر جهت تخلیه ترشحات ریه و بهبود تنفس به شما کمک خواهد کرد .
- ✓ بخور مرطوب در کنار تخت جهت تسهیل در خروج ترشحات برای شما استفاده میشود .
- ✓ داشتن پوزیشن خاص در حین بستری (سر تخت 30 درجه بالا و یا نیمه نشسته (به وضعیت جسمی شما کمک کرده و تنفس شما راحت تر میشود.
- ✓ در صورت استفاده از اکسیژن از طریق کانولا و ماسک از دستکاری آن اجتناب کنید .
- ✓ اضطراب خود را کاهش دهید چون کاهش اضطراب نیاز به اکسیژن را کمتر میکند . ایجاد تورم و اصطلاحا پف کردن اندام ها به دلیل مصرف داروهای کورتیکواستروئید میباشد.
- ✓ بهداشت فردی را جهت جلوگیری از عفونت های ناشی از عملکرد ضعیف سیستم ایمنی رعایت کنید .
- ✓ در صورت تنگی نفس و سرفه پرستار را آگاه کنید.

❖ دارو

- ✓ داروها طبق تجویز پزشک در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما تجویز و طریقه استفاده از اسپری استنشاقی و اسپاسمی و آسم یار به شما آموزش داده میشود.



❖ در استفاده از اسپری به نکات زیر توجه کنید

- ✓ درب اسپری را برداشته و آن را به خوبی تکان دهید .
- ✓ ابتدا دو الی سه تنفس عمیق انجام دهید .
- ✓ ظرف دارو را بصورت وارونه طوری نگه دارید که انگشت اشاره در بالا و شست در پایین ظرف قرار گیرد .
- ✓ قطعه دهانی را در دهان قرار دهید و درحالیکه نفس میکشید با انگشت اشاره ظرف دارو را فشار دهید تا اولین پاف دارو را بزنید .
- ✓ به مدت 5 تا 10 ثانیه درحالیکه اسپری همچنان در دهانتان است چند نفس بکشید.
- ✓ بعد از استفاده از اسپری دهان خود را بشویید زیرا برخی اسپری ها باعث بروز برفک دهانی میشوند .
- ✓ جهت استفاده از اسپری بهتر است از آسم یار استفاده کنید .
- ✓ از دستکاری سرم و رابط ها متصل به خود اجتناب کنید.



دستور العمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

آسم

❖ رژیم غذایی

- ✓ سلنیوم و منیزیم هم در بهبود بیماری مهم هستند
- منابع عمده غذایی سلنیوم: غذاهای دریایی، جگر، قلوه و گوشت ماکیان
- منابع جذب منیزیم: دانه ها، مغزها، حبوبات، غلات و سبزیجات با برگ تیره
- ✓ رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری و سرشار از ویتامین ث مصرف نمایید
- ✓ روزانه 2 الی 3 لیتر مایعات مصرف نمایید و از مصرف غذاهای حساسیت زا مانند شکلات اجتناب نمایید .
- ✓ از دریافت وعده های غذایی پر حجم اجتناب کنید، مواد غذایی غنی از ویتامین های B6-A-C و روی را افزایش دهید بنابراین مقادیر بیشتری کلم بروکلی، گریپ فروت، پرتغال، فلفل شیرین، کیوی، آب گوجه فرنگی و گل کلم مصرف کنید.
- ✓ برخی مواد غذایی از قبیل سیب، پیاز، مرکبات و توتها به علت وجود ماده ای به نام کوئرتستین در تنظیم فعالیت سیستم ایمنی بدن نقش دارند، سعی کنید در طول هفته پنج بار یا بیشتر از این مواد استفاده کنید.
- ✓ منابع غذایی حاوی ویتامین E مانند مغزها را بیشتر مصرف کنید. بعضی مغزها مانند بادام زمینی و یا بادام هندی، حساسیت زا هستند پس از مصرف این نوع مواد حساسیت زا خودداری کنید.
- ✓ مصرف اسیدهای چرب امگا3 مفید است. گردو و ماهی از منابع خوب این اسیدهای چرب می باشند. البته در صورت ابتلا به آلرژی غذایی به ماهی، مصرف ماهی باید از رژیم حذف شود.
- ✓ کافئین از طریق شل کردن ماهیچه ها، مجاری هوایی را باز میکند. مصرف 2 تا 3 لیوان چای در روز میتواند برای بزرگسالان مفید باشد .

❖ فعالیت

- ✓ ورزش منظم سبک انجام دهید و استراحت متناوب بین فعاليتها داشته باشید و از فعاليتهاى سنگین اجتناب نمایید .
- ✓ بهتر است قبل از انجام ورزش، داروهای تجویز شده را استفاده نمایید.

❖ مراقبت

- ✓ تمرینات ورزشی سنگین، آلرژنها، گرده گیاهان، حیواناتی مثل گربه و اسب، دود سیگار، بوی عطر و گرد و غبار، دود سیگار، سرماخوردگی و عفونتهای ویروسی، هیجانان و استرسها و تغییر درجه حرارت از عوامل مستعد کننده و تشدید کننده حملات آسم میباشند از آنها اجتناب کنید.
- ✓ از دستگاه بخور جهت مرطوب کردن محیط اطراف استفاده کنید.



✓ جهت خروج خلط تنفس عمیق و سپس سرفه کنید (سرفه مداوم و سه تایی) و تنفس لب غنچه ای انجام دهید (در حالی که لبهای خود را بحالت غنچه ای که حالت سوت زدن یا بوسیدن در آورده و بازدم انجام دهید)

✓ اتاق خواب خود را از مواد حساسیت زا و محرک به دور نگه دارید.

✓ از به کار بردن بالش و تشک حاوی پر اجتناب کنید .

✓ برای کاهش انزوا پرده ها را کشیده و درها را باز بگذارید .

✓ بهداشت دهان و حلق را رعایت نمایید .

✓ در هنگام حمله آسم آرامش خود را حفظ نمایید و تمرینات تنفسی را انجام داده و مقدار زیادی آب یا چای ولرم مصرف نموده و داروهای تجویز شده را مصرف نمایید.

✓ در صورت داشتن تنفس های تند و سریع و احساس کمبود اکسیژن، یک دست را روی سینه و دست دیگر را روی شکم قرار داده و دم را طوری انجام دهید که دست روی شکم به طرف جلو کشیده شود و تنفس لب غنچه ای را انجام داده و درحالی که با دست روی شکم به داخل فشارمیدهید به آرامی بازدم کنید و دست روی سینه را به همان حال نگه دارید.

❖ زمان مراجعه بعدی

✓ در صورت داشتن حمله آسمی و عدم پاسخ به اقدامات درمانی توصیه شده توسط پزشک سربعاً به پزشک مراجعه و یا 115 را مطلع نمایید.

✓ در صورت داشتن تنگی نفس، خس خس قابل شنیدن، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون، اضطراب، ادم ریه، سرفه های خشک و سخت سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.

❖ دارو

✓ اسپری متسع کننده برونش را همیشه به منظور حمله آسم همراه داشته باشید.

✓ در صورتی که دچار حمله آسم شدید هر 20 دقیقه 2 یا 4 پاف از اسپری را تا سه نوبت استفاده کنید تا حمله فروکش کند.

واحد آموزش سلامت بیمارستان شهید رائی شاهیندژ